

# CYPIOBOL

TESTOSTERONA CIPIONATO  
250 mg/ ml



## TESTOSTERONA CIPIONATO

Solución inyectable

**PRESENTACIÓN:** Cajas de 5 y de 10 ampollas de 1 ml.  
**VIA DE ADMINISTRACIÓN:** Intramuscular

### COMPOSICIÓN

Cada ampolla contiene:

Cipionato de Testosterona	250 mg
Excipientes	c.s.

### INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Como reemplazo hormonal o sustitución en la disminución o ausencia de testosterona endógena.

1. El hipogonadismo primario (congénito o adquirido) insuficiencia testicular debido a la criptorquidia, torsión bilateral, orquitis, síndrome de los testículos; u orquiectomía.
2. Hipogonadismo hipogonadotrópico (congénito o adquirido) gonadotropina idiopática o deficiencia de LHRH o lesión pituitaria-hipotalámica por tumores, trauma o radiación.

### POSOLÓGIA Y USOS

Debe ser administrado por inyección intramuscular profunda, preferentemente en el músculo glúteo.

Dosis recomendada:

Para la terapia de reemplazo en el varón con hipogonadismo, deben administrarse 200 mg cada dos semanas.  
Dosis máxima: 400 mg por mes.

Si se ha perdido una dosis de este medicamento, se debe tomar tan pronto como sea posible. Sin embargo, si ya casi es hora para la siguiente dosis, omita la dosis olvidada y vuelva a su horario regular de dosificación. No duplique las dosis.

### CONTRAINDICACIONES:

1. Hipersensibilidad al principio activo
2. Hombres con carcinoma de mamas o con conocido o sospechado carcinoma de próstata.
3. Mujeres embarazadas o que pueden quedar embarazadas.
4. Pacientes con trastornos cardíacos, hepáticos o renales serios.

### EMBARAZO Y LACTANCIA:

Está contraindicado durante el embarazo, así como en mujeres en periodo de lactancia.

### REACCIONES ADVERSAS:

Las siguientes reacciones adversas en hombres se han asociado con la terapia con andrógenos en general:

Endócrinos y urogenital: ginecomastia y frecuencia y duración excesiva de las erecciones. Puede ocurrir oligospermia con dosis altas.

Piel y del tejido subcutáneo: hirsutismo, patrones masculinos de calvicie, seborrea, y acné

Disturbios de los fluidos y electrolitos: retención de sodio, cloruro, agua, potasio, calcio y fosfatos inorgánicos.

Gastrointestinal: náusea, ictericia colestásica, alteraciones en los test sobre las funciones del hígado, en raras ocasiones neoplasma hepatocelular y peliosis hepática.

Hematología: supresión de los factores de coagulación II, V, VII y X, sangrado en pacientes en tratamiento concomitante con anticoagulantes y policitemia.

Sistema nervioso: aumento o disminución de la libido, dolor de cabeza, ansiedad, depresión, y parestesia generalizada.

Alérgica: Hipersensibilidad, incluyendo manifestaciones de la piel y reacciones anafilácticas.

Varios: Inflamación y dolor en el sitio de la inyección intramuscular.

### INTERACCIONES CON ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS:

Agentes inductores enzimáticos pueden disminuir y medicamentos inhibidores de enzimas pueden aumentar los niveles de testosterona. Por lo tanto, puede requerirse el ajuste de la dosis.

Los andrógenos pueden mejorar la tolerancia a la glucosa y disminuir la necesidad de insulina u otros medicamentos antidiabéticos en pacientes diabéticos.

Las dosis altas de andrógenos pueden mejorar la acción anticoagulante de agentes de tipo cumarina que permitan una reducción de la dosis de estos agentes.

El uso de Cypiobol puede resultar en la disminución de los niveles de la globulina transportadora de tiroxina, dando como resultado un total de disminución de los niveles séricos de T4 y aumento de la captación de resina de T3 y T4. Los niveles de hormonas tiroideas libres se mantienen sin cambios, y no hay evidencia clínica de la disfunción de la tiroides.

### SOBREDOSIS:

No hay un antídoto específico disponible. Se debe dar tratamiento sintomático y de soporte. En caso de sobredosis recurrir a Emergencias Médicas. Avda. Gral Santos, Tel: (021) 206206 o al Centro Nacional de Toxicología: Gral. Santos y Teodoro Mongelos, Tel: (021) 220418.

Conservar una temperatura inferior a 25°C, en lugar seco y fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta

FABRICADO POR: LABDHI PHARMACEUTICALS (India)

IMPORTADO POR: PHARMAIMPORT SRL – DIVISION IDN PHARMATECH

Estrella c/ O'Leary, Edificio Líder IV, Piso 22, Oficina: 228 (Paraguay),  
Tel.: 595 21 496359

Sitio web: [www.idnpharmatech.com](http://www.idnpharmatech.com)

E-mail: [contacto@idnpharmatech.com](mailto:contacto@idnpharmatech.com)