

# MESTEROLIC

**MESTEROLONA**  
25 mg



MESTEROLIC  
Mesterolona

**PRESENTACIÓN:** Caja de 30 tabletas recubiertas.

**VIA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

## COMPOSICIÓN

Cada tableta contiene:

MESTEROLIC	
Mesterolona	25 mg
Excipientes	c.s.

## INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Tratamiento del déficit de andrógenos: hipogonadismo, criptorquismo, orquitis, torsión bilateral, orquidectomía, impotencia, climaterio masculino, infertilidad masculina por oligospermia.

## POSOLOGÍA Y USOS

Debe ser administrado por vía oral.

Adultos:

- Hipogonadismo: inicialmente, 25 mg/8 h durante varios meses; mantenimiento 25 mg/8-12 h. Se aconsejan tratamientos cortos de 4-6 semanas de duración que pueden repetirse varias veces, o bien, tratamientos ininterrumpidos durante varios meses.
- Oligospermia: 25 mg/8-12 h durante 90 días (ciclo espermatogénico completo). En ocasiones es conveniente repetir el tratamiento con el andrógeno después de un descanso de varias semanas.
- Impotencia, climaterio masculino: inicialmente, 25 mg/8 h; mantenimiento, 25 mg/12-24 h

Niños: No se recomienda para los niños.

## CONTRAINDICACIONES

Está contraindicado en los pacientes con:

- Cáncer de la próstata
- Tumor de hígado actual o tener antecedentes
- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes
- Diabetes
- Migraña

## REACCIONES ADVERSAS

- Molestia o dolor en el estómago (abdomen).
- Erecciones frecuentes o erecciones que no desaparecen.
- Dolor de cabeza y otros dolores y molestias.
- Acné, manos o pies hinchados, aumento de la presión arterial, aumento del vello corporal, problemas de mama o de próstata, aumento de peso, calvicie.

## INTERACCIONES CON ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS

- Anticoagulantes orales: es posible un aumento del efecto anticoagulante. En pacientes con tratamiento con anticoagulantes orales, es preciso realizar una estrecha monitorización, sobre todo en el momento de comenzar el tratamiento con andrógenos o en el de interrumpirlo.
- Antidiabéticos: los efectos metabólicos de los andrógenos pueden disminuir la concentración de glucosa en sangre y, por consiguiente, reducir las necesidades de insulina.
- Ciclosporina: hay estudios con metiltestosterona en los que se ha registrado aumento de las concentraciones plasmáticas de ciclosporina, por lo que puede aumentar el riesgo de nefrotoxicidad. Otros andrógenos pueden producir el mismo efecto.
- Oxifenbutazona: la administración simultánea de oxifenbutazona y andrógenos puede dar lugar a concentraciones séricas de oxifenbutazona elevadas.

## EMBARAZO Y LACTANCIA

Está contraindicado durante el embarazo, así como en mujeres en periodo de lactancia.

## SOBREDOSIS

La sobredosis aguda puede producir náuseas y malestar gastrointestinal. El uso crónico puede causar una exageración de las características masculinas y efectos relacionados con las hormonas masculinas.

Si se sospecha una sobredosis, póngase en contacto con su centro de control de intoxicaciones o la sala de urgencias. Emergencias Médicas. Avda. Gral Santos, Tel: (021) 206206 o al Centro Nacional de Toxicología: Gral. Santos y Teodoro Mongelos, Tel: (021) 220418.

Almacenar en un lugar seco y fresco, por debajo de 25°C. Proteger de la luz directa. Mantener alejado de niños y mascotas.  
Venta bajo receta

## FABRICADO EN: INDIA

## IMPORTADO POR: PHARMAIMPORT SRL - DIVISIÒN IDN PHARMATECH

Estrella c/ O Leary, Edificio Líder IV, Piso 22, Oficina: 228  
Asunción - Paraguay  
Sitio web: [www.idnpharmatech.com](http://www.idnpharmatech.com)  
E-mail: [contacto@idnpharmatech.com](mailto:contacto@idnpharmatech.com)