

MASTEBOL RAPID



DROSTANOLONA PROPIONATO
100 mg/ml

DROSTANOLONA PROPIONATO

Solución inyectable

PRESENTACIÓN: Cajas de 5 y 10 ampollas de 1 ml.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular

COMPOSICIÓN

Cada ampolla de 1 ml contiene:

Drostanolona Propionato	100 mg
Excipientes: Aceite de Arachis, alcohol bencílico	c.s.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

MASTEBOL RAPID está indicado principalmente en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama recurrente, en una terapia hormonal combinada.

También en la terapia de reemplazo hormonal en el hombre, en condiciones asociadas con los síntomas de la deficiencia o ausencia de testosterona endógena, como en casos de hipogonadismo primario (congénito o adquirido) y de hipogonadismo hipogonadotrópico (congénito o adquirido).

El propionato de Drostanolona es un esteroide con propiedades anabólicas moderadas. Los pacientes a menudo reportan aumentos en la fuerza y la resistencia muscular.

POSOLOGÍA Y USOS

Forma de administración: Mastebol es sólo para uso intramuscular. No debe administrarse por vía intravenosa.

En general, la dosis de Mastebol se debe ajustar de acuerdo a la respuesta del paciente individual. Varía dependiendo de la edad, el sexo, el diagnóstico del paciente y la eventual aparición de reacciones adversas.

Dosis en adultos: 100 mg de 1 a 3 veces por semana.

Las mujeres que decidan utilizar Mastebol deben hacerlo en una dosis de 50-100 mg por semana.

Dado que se utiliza el éster de propionato con este compuesto, las inyecciones deben repetirse por lo menos cada 3 o 4 días con el fin de mantener un nivel constante de la hormona en la sangre.

Para la terapia de reemplazo hormonal en el hombre hipogonadal, deben administrarse 50 a 400 mg cada 2 a 4 semanas.

CONTRAINDICACIONES:

1. Pacientes varones con carcinoma de próstata o mamas.
2. Carcinoma de mamas en algunas mujeres.
3. Embarazo, a causa de la masculinización del feto.
4. Nefrosis o la fase nefrótica de la nefritis.
5. En caso de enfermedad cardiovascular conocida, la contraindicación es relativa y se recomienda la supervisión médica.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Está contraindicado durante el embarazo, así como en mujeres en periodo de lactancia.

REACCIONES ADVERSAS:

- Acné, hirsutismo (crecimiento anormal de vello corporal), cambios en la voz, pérdida de cabello.
- Desarrollo sexual precoz en los varones, antes de la pubertad (mayor número y duración de las erecciones).
- Reducción de la producción de esperma, producción anormal de espermatozoides (oligospermia, azoospermia).
- Erecciones dolorosas y no deseadas (priapismo).
- Cambios en la libido (deseo sexual).
- Dolor de cabeza, depresión, malestar estomacal, náuseas (sensación de malestar).
- Aumento del crecimiento de los huesos.
- Ansiedad, irritabilidad, nerviosismo, debilidad, calambres musculares.
- Sensación general de hormigueo o ardor, ictericia (coloración amarillenta de los ojos o la piel), prurito, dolor en las articulaciones, enfermedad de la sangre que afecta a los glóbulos rojos.

En la mujer pueden ocurrir los siguientes efectos de masculinización, a dosis altas, incluyendo:

- Acné, hirsutismo (crecimiento anormal de vello corporal), pérdida de cabello.
- Profundización de la voz.
- Crecimiento del clítoris.
- Reducción de mamas.

INTERACCIONES CON ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS:

Los andrógenos pueden aumentar la sensibilidad a los anticoagulantes orales. La dosificación de anticoagulante puede requerir una reducción con el fin de mantener la hipoprotrombinemia terapéutica satisfactoria.

La administración concomitante de oxifenbutazona y andrógenos puede dar lugar a niveles séricos elevados de oxifenbutazona.

En los pacientes diabéticos, los efectos metabólicos de los andrógenos pueden disminuir la glucosa en sangre y por lo tanto, las necesidades de insulina.

SOBREDOSIS:

Los estudios de casos e investigaciones científicas indican que dosis altas pueden causar efectos en el estado de ánimo y el comportamiento. Además pueden causar el aumento peligroso de la temperatura corporal y la presión arterial y aumentar la incidencia de insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular. La sobredosis extrema puede dar lugar a convulsiones, colapso y coma.

En caso de sobredosis recurrir a Emergencias Médicas: Avda. Gral Santos, Tel.: (021) 206206; o al Centro Nacional de Toxicología: Gral. Santos y Teodoro Mongelós, Tel.: (021) 220418.

Conservar a una temperatura inferior a 25°C, en lugar seco y fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta

FABRICADO POR: LABDHI PHARMACEUTICALS (India)

IMPORTADO POR: PHARMAIMPORT SRL – División IDN Pharmatech
Estrella c/ O'Leary, Edificio Líder IV, Piso 22, Oficina: 228 (Paraguay),
Sitio web: www.idnpharmatech.com
E-mail: contacto@idnpharmatech.com